

Il presente modulo ha lo scopo di informarla sulle caratteristiche della procedura diagnostica, a cui verrà sottoposto. La preghiamo pertanto di leggerlo attentamente e di chiedere qualsiasi spiegazione, informazione o ulteriori dettagli che desidera sapere ai medici che la stanno curando.

Descrizione procedura

Il paziente verrà invitato a bere del mezzo di contrasto radiopaco e verranno poi scattati alcuni radiogrammi in diverse proiezioni.

Rischi della metodica

Pur non trattandosi di procedura ad alto rischio, esiste la remota possibilità di passaggio di mdc in peritoneo in caso di soluzioni di continuità della parete intestinale (prevalentemente nel post-chirurgico): ciò comporta il passaggio in cavità peritoneale del mezzo di contrasto, senza tuttavia determinare l'insorgenza di peritonite in quanto il mezzo di contrasto viene riassorbito dal peritoneo ed eliminato per via renale. Sono stati segnalati, in questa già rara eventualità, rarissimi casi di reazione allergica allo iodio contenuto nel mezzo di contrasto. Queste vengono classificate come lievi (nausea, vomito, prurito) o moderate (vomito profuso, orticaria diffusa, edema facciale, broncospasmo) e sono in genere risolte con semplici provvedimenti terapeutici. Rarissimamente si possono verificare reazioni severe (shock ipotensivo, edema polmonare, arresto cardiorespiratorio).

Per qualsiasi ulteriore informazione telefonare alla segreteria della diagnostica per immagini in cui è stato prenotato l'esame.

Sede Ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino, loc. Branca 075 9270692

Sede Ospedale di Umbertide 075 9422209

Sede Ospedale di Città di Castello 075 8509239

Sede Ospedale di Assisi 075 8139206

Sede Ospedale Media Valle del Tevere, loc. Pantalla 075 8880677

Sede Poliambulatorio Piazzale Europa Perugia 075 5412924

Sede Ospedale Castiglione del Lago 075 9526230

Sede Casa della Salute di Città della Pieve 0578 290817

Sede Presidio di Passignano sul Trasimeno 075 8298704